

**METHODE ZUR ERFASSUNG DER VERWIRRTHEIT (CAM)
GEKÜRZTE VERSION ARBEITSBLATT**

I. AKUTER BEGINN UND FLUKTUIERENDER VERLAUF

a) Gibt es Hinweise auf eine akute Veränderung des mentalen Status des Patienten/der Patientin im Vergleich zum Normalzustand (baseline) des Patienten/der Patientin?

Nein___ Ja___ Unklar___

b) Fluktuierte das (abnormale) Verhalten über den Tag, d. h. tendierte es dazu, zu kommen und zu gehen oder in der Stärke zu- und abzunehmen?

Nein___ Ja___ Unklar___

II. UNAUFMERKSAMKEIT

Hatte der Patient/die Patientin Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, war er/sie z. B. schnell ablenkbar oder hatte er/sie Schwierigkeiten, einem Gespräch zu folgen?

Nein___ Ja___ Unklar___

III. DESORGANISIERTES DENKEN

War das Denken des Patienten/der Patientin desorganisiert oder inkohärent, wie z. B. weitschweifende oder irrelevante Konversation, unklarer oder unlogischer Gedankenfluss oder unberechenbares Springen von Thema zu Thema?

Nein___ Ja___ Unklar___

IV. VERÄNDERUNG DES BEWUSSTSEINSZUSTANDS

Wie würden Sie den Bewusstseinszustand des Patienten/der Patientin insgesamt beschreiben?

- Wach (normal)
- Hypervigilant
- Lethargisch (schläfrig, leicht weckbar)
- Stupor (schwer weckbar)
- Koma (nicht weckbar)
- Unklar

Wurde oben etwas anderes als „Wach“ oder „Unklar“ als Antwort angegeben?

Nein___ Ja___

Hinweis: Wenn alle Antworten im KASTEN 1 angekreuzt sind und zumindest eine Antwort in KASTEN 2, wird die Diagnose Delir empfohlen.

Copyright © Adaptiert von: Inouye SK et al, Clarifying Confusion: The Confusion Assessment Method. A New Method for Detection of Delirium. Ann Intern Med. 1990; 113:941-8. © 2003, Hospital Elder Life Program, LLC. Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung