

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA CONFUSÃO (CAM) PLANILHA DA VERSÃO CURTA

I. INÍCIO AGUDO E CURSO FLUTUANTE

a) Há evidência de uma mudança aguda do estado mental inicial do paciente?

Não___

QUADRO 1

Sim___

Incerta___

b) O comportamento (anormal) flutuou durante o dia, isto é, tendeu a surgir e desaparecer ou a aumentar e diminuir de gravidade?

Não___

Sim___

Incerto___

II. DESATENÇÃO

O paciente teve dificuldade em focalizar sua atenção, por exemplo, distraiu-se facilmente ou teve dificuldade em acompanhar o que estava sendo dito?

Não___

Sim___

Incerto___

III. PENSAMENTO DESORGANIZADO

O pensamento do paciente foi desorganizado ou incoerente, tal como conversação dispersiva ou irrelevante, fluxo de ideias pouco claro ou ilógico, ou mudança imprevisível de assunto?

Não___

QUADRO 2

Sim___

Incerto___

IV. ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

De um modo geral, como você classificaria o nível de consciência do paciente?

- Alerta (normal)
- Vigilante (hiperalerta)
- Letárgico (sonolento, fácil de despertar)
- Estupor (difícil de despertar)
- Coma (impossível de despertar)
- Incerto

Outra resposta que não seja Alerta ou Incerto foi dada à pergunta acima?

Não___

Sim___

Observação: Se todos os itens do QUADRO 1 e pelo menos um item do QUADRO 2 forem marcados sugere-se o diagnóstico de delirium.

Copyright © Adaptado de Inouye SK et al, Clarifying Confusion: The Confusion Assessment Method. A New Method for Detection of Delirium. Ann Intern Med. 1990; 113:941-8. Copyright 2003, Hospital Elder Life Program, LLC. Não pode ser reproduzido sem autorização prévia.